

Zeramec bevorder 'n hoër speengewig en verbeter groei by kalwers. Die kalwers is terselfdertyd gesonder en vertoon opvallend beter.

KALWERS

Deur Erich Walter

Bevorder groei by kalwers

Hoe maak 'n mens nou om in hierdie strawwe ekonomiese toestande kop bo water te hou. Daar is nie 'n beter manier as om kalwers so vinnig moontlik te laat groei om as speenkalf of mark gereed te verkoop nie. Met min insette is dit wel moontlik om binne 90 dae na behandeling 'n rendement van 1 : 5 te haal. Om goeie groei in kalwers oor 'n periode te handhaaf moet kalwers op die regte tyd ontworm word en 'n groeistimulant kry.

Wat sê boere oor Zeramec:-

Mnr. Dana Wiid - Vryburg ... met sy eerste proefneming om die doeltreffendheid van Zeramec te beproef, het hy die middel op die ouderdom van drie maande aan 50 % van die kalwers toegedien, terwyl die ander helfte behandel is met Virbamec LA, 'n antiparasitiese middel wat ivermektien bevat. Die kalwers wat met Zeramec behandel is, het op speenouderdom gemiddeld 7 kg meer geweg. Dit het aan Wiid bewys dat die gebruik van Zeramec plus kruipvoer kostedoeltreffend is. In 'n 2de proef het Wiid kalwers wat hy ná speen in die voerkraal geplaas het, gebruik. Hy het dieselfde middels ewekansig by ewe groot groepe gebruik. Ná 3 maande in die voerkraal was die groep wat Zeramec ontvang het, gemiddeld 22 kg swaarder. Dit is te wyte aan die feit dat Zeramec bo en behalwe 'n ontwormingsmiddel ook 'n groeistimulant bevat.

Gebruik Zeramec om u kalwers groot te maak.

Zeramec – Reg. Nr. G3660 (Wet 36/1947) Bevat: Ivermektien 1 % m/v en Zeranol 1 % m/v



Jy hoef nie te lewe met die "As hulle net..." situasie nie. Daar is 'n oplossing...

BEES EN WILD

Deur Dayle Sinclair

Meer kos is eintlik 'n realiteit

Tegnologie is nou beskikbaar wat vee instaat stel om onsmaklike grasse en oesreste beter te kan benut.

Die tegnologie is beskikbaar in die vorm van 'n produk bekend as **Browse Plus**. Die produk is al baie jare in gebruik, hoofsaaklik om die benutting van die blaarkomponent van struik en bome in vee en wild te verhoog, deur die neutralisering van die antivoedingstaniene.

In die afgelope paar jaar het baie boere egter berig dat beeste wat **Browse Plus** ingeneem het, meer droë gras gevreet het. Eksperimentele inligting oor beeste wat op stoppellende loop is beperk. In een proef waar beeste op mieliestoppellende gewei het, het die **Browse Plus** groep 3.18 kg oesreste per dag ingeneem terwyl die kontrolegroep net 1.97 kg per dag ingeneem het.¹

Browse Plus – Reg. Nr. V11013 (Wet 36/1947) Bevat: Poliëtiënglikol 930 g/kg, Polivinil pirrolidoon, Ca(OH)² en Eksiipiënte 70 g/kg

REFERENCES: 1. Duncan & McKenzie, "Trial to determine the effect of dosing Browse Plus to steers on maize stover." Agricura (Private) Limited, Annual Technical Report, 1994. 2. Salawu, Acamovic, Stewart, & DeB.Hovell, "Quercacho tannins with or without Browse Plus in sheep diets; effect on digestibility of nutrients in vivo and degradation of grass hay in sacco and in vitro" Animal Feed Science and Technology 69(1997) 67-78. 3. Ethyl Concentrate Feed, Rumenco Company, UK Bulletin R1 No.10.

Browse Plus het 'n beduidende effek om normale rumenaktiwiteit te herstel.² Daar is bewys dat behandelde diere se rumenmikrobes vinnig herstel het en die spysverteringskanaal meer aktief is, wat meebring dat diere meer gras en oesreste inneem. Dit is deels te wyte aan die molasses-tillaat (MDDS) in die formulاسie wat 'n gesonde mikrobe populasie aanmoedig. Dit verhoog die potensiaal vir meer doeltreffende gebruik van aanvullende voeding.³



Neuswurm is 'n parasiet wat dwarsoor Suidelike Afrika voorkom. Die volwasse vlieg is aktief in die somer maande (Okt – April).

Deur Dayle Sinclair

Neuswurm vreet winste

Neuswurm lê larwes buite om die skaap se neusgate. Hierdie larwes kruip dan in die neusholtes en sinusse waar hulle vasheg met hakies in hul monde en voed op die slymerige eksudaat wat hier gevorm word. Dit veroorsaak baie irritasie wat dan lei tot 'n groter afskeiding van slym. Neuswurm besmetting veroorsaak produksie skade: Die irritasie lei tot 'n verminderde eetlus en ook 'n vermindering in die

vreet tyd. 'n Verswakte massa-toename volg. **Proewe het bewys dat skape wat behandel is teen neuswurm tussen 1,5 kg en 1,9 kg beter gegroei het as onbehandelde skape.**

Ander effekte van neuswurm besmetting is **swakker kondisie en ook sekondêre bakteriese besmettings.**

Waarmee om te behandel:

Lammers: Prodose Orange
Neuswurm, Rondewurms, Lewerslak, Melklintwurm – **5 weke nawerking teen haarwurm. Uiters belangrik dat lammers teen melklintwurm behandel word en terselfdertyd teen neuswurm en rondewurm beskerm is.**



SKAPE

Groot skaap: Prodose Yellow LA

Neuswurm, Rondewurms, Lewerslak, Peervormigemaaglak – **5 weke nawerking teen haarwurm. As 'n breë-spektrum middel benodig word gebruik dan Prodose Orange.**

WANNEER OM TEEN NEUSWURM TE BEHANDEL: NOVEMBER BEHEER DIE NUWE LENTE BESMETTING | **FEB/MAART** BEHEER DIE LAAT SOMER EN HERFS BESMETTING

Prodose Orange – Reg. Nr. G2101 (Wet 36/1947) Bevat: Albendasool 1,90 % m/v en Klosantel 3,94 % m/v • **Prodose Yellow LA** – Reg. Nr. G1959 (Wet 36/1947) Bevat: Klosantel 7,5 % m/v.

Virbac RSA (Edms) Bpk (Reg. Nr. 1990/003743/07)
Privaatsak X115, Halfway House 1685, Republiek van Suid-Afrika
Tel: (012) 657-6000 Faks: (012) 657-6067