

Hierdie artikel  
bespreek kortliks  
een van die belang-  
rikste sindrome  
gedurende winter

Deur Dr Mohamed Moola

BEES



## Effektiewe BRI beskerming

**Bees Respiratoriese Infeksie (BRI)** is 'n belangrike bron van ekonomiese verlies agv van siekte en vrektes. 'n Kombinasie van virusse, bakteriële infeksies, omgewings faktore en stres veroorsaak die komplekse siekte. Die siekte proses word geassosieer met Bees Virus Diarree (BVD), Bees Infeksieuse Rhinotracheitis virus (IBR), Parainfluenza virus 3 (PI-3) en Respiratoriese Sinsitium virus (BRV).

**Enzootiese Kalf Pneumonie** veroorsaak verliese interme van verminderde gewigstoename. Dit kan ook deur boogenoemde virusse veroorsaak.

Virbac het twee produkte as 'n hulpmiddel in die voorkoming van siektes veroorsaak deur BVD (Tipe 1 en Tipe 11), IBR, PI-3 & BRV. Die Virbac entstowwe

**Titanium 5** (gemodifiseer lewend) (T5) en **Master Guard Preg 5** (geinaktiveer) (MGP 5). Al twee is slegs verkrybaar by u veearts. **Hierdie entstowwe word as volg gebruik:**

**Jong diere (5-6 maande oud):** indien diere op 5 maande ge-ent word (**T5**), herhaal 'n maand later (**T5**). Herhaal enting jaarliks (**T5**) (voor die eerste KI / teëlseisoen ent 'n minimum van 30 dae VOOR teëling).

**Koeie (nie-dragtig):** twee (**T5**) inentings 'n maand uitmekaar.

**Koeie (dragtig):** twee inentings (**MGP 5**) 'n maand uitmekaar.

**Voerkraaldiere:** ent (**T5**) diere verkieslik 10-14 dae voordat hulle in die kraal ingaan, indien nie moontlik nie, ent tydens prosessering.



Titanium 5 – Reg. Nr. G3413 (Wet 36/1947)



Master Guard Preg 5 – Reg. Nr. G3412 (Wet 36/1947)

Skape se vermoë om  
parasiete te hanteer  
wissel geweldig en  
daar is sekere faktore  
wat 'n invloed het

Deur Dayle Sinclair

SKAAP



## Ken jou Skape

**D**ie faktore is fisiologiese status en gesondheid.

### Fisiologiese Status

Vanaf 'n paar weke voor lam tot en met 'n paar weke na lam, ondervind ooie 'n verslapping in hulle immuniteit. Op die stadium is die ooi meer vatbaar vir inwendige parasiete, en sy skei dan 'n hoër hoeveelheid parasiet eiers op die weiding uit.

Dit veroorsaak dan 'n hoër besmetting in die ooie en is ook 'n gevaar vir die lam. Dus is dit belangrik om ooie met 'n breë spektrum doseermiddel te doseer omtrent 4 weke voor lam – Gebruik **Prodose Orange** vir omvattende beskerming.

Omdat die verslapping tot 'n paar weke na lam duur, moet die volgende dosering omtrent 4 weke na lam wees. Die behandeling sal ook behulpzaam wees om die gevaar vir die lammers te verminder.

### Gesondheid

Diere wat in goeie kondisie en gesond is het oor die algemeen 'n beter vermoë om parasiete te hanteer. In stresvolle tye is dit belangrik

om goeie voeding toe te pas, sowel as die noodsaaklike dosering te doen.

**Prodose Orange** bied beskerming teen 'n breë-spektrum van inwendige parasiete

- ▶ Beheer van 'n breë-spektrum van Rondewurms
- ▶ Neuswurm
- ▶ Lewerslak en Reuselewerslak
- ▶ Melkintwurm

**Prodose Orange** beskerm verder deur sy eierdodende effek. Die Rondewurm eiers teenwoordig met dosering word verhoed om uit te broei, dit verseker dat minder larwes op die weidings beland om die vee te besmet.

Nou kan u verstaan hoekom so baie boere op **Prodose Orange** vertrou om hulle waardevolle skape te beskerm – **beter beskerming = beter waarde = meer wins.**

**Prodose Orange is SA boere se gunsteling skaap doseermiddel!**



Prodose Orange – Reg. Nr. G2101 (Wet 36/1947)  
Bevat: Albendasool 1,9 % m/v en Klosantel 3,94 % m/v.

Somer is opad, maak dubbel  
seker dat u ten volle u diere  
vir bosluise, luise en vlieë  
behandel

Deur Corne Mostert

SKAAP, BEES EN WILD



## Maak dubbel seker en gee bosluise 'n knak vir die somer

**M**et **AMIPOR pour-on** kan u **DUBBEL SEKER** maak. **Amipor** het 2 aktiewe bestanddele; 1 % Amitras, 1 % Sipermetrien en 5 % Piperoniël-butoksied wat 'n dubbele aksie het op bosluise, luise en vlieë. **Amipor pour-on** kan vir beeste,

skape en wild gebruik word. U kan ook **Eliminate** 'n transdermale middel met die aktief (Abamektien) gebruik wat vir u die gerief gee van bloubosluis, luise en interne parasiet beheer in die vorm van 'n opgiemiddel.

**Eliminate** – Reg. Nr. G3348 (Wet 36/1947) Bevat: Abamektien 0,5 % m/v • **Amipor** – Reg. Nr. G2058 (Wet 36/1947) Bevat: Amitras 1 % m/v, Sipermetrien 1 % m/v en Piperoniëlbutoksied 5 % m/v.



Maak **DUBBEL SEKER** en verminder nou u bosluis populasie en gee hul nou 'n knak vir die somer asook die luise wat nog aktief is deur **Amipor** of **Eliminate** te gebruik.

Virbac RSA (Edms) Bpk (Reg. Nr. 1990/003743/07)  
Privaatsak X115, Halfway House 1685, Republiek van Suid-Afrika  
Tel: (012) 657-6000 Faks: (012) 657-6067